

# *Conocybe apala*

Bolhoedbreeksteeltje



Frank Coulier waarnemingen.be  
Licentie CC BY-NC-ND



Frank Coulier waarnemingen.be  
Licentie CC BY-NC-ND

# *Conocybe apala*

## Bolhoedbreeksteeltje



## Microscopía de hongos

## Pilzsuche

Champignons  
de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

[NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen](#)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**  
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

**Hoed:** 8 – 15 (-20) mm, fusiform tot conisch, slaapmutsachtig als jong, later klokvormig tot conisch, oppervlak effen, droog, tenslotte schurftig onder een handlens, zwak hygrofaan, lichtcrèmekleurig tot ivoorkleurig, oud vuilbeige met een lila tint, radiaal gerimpeld, bij vocht met een gestreepte randzone, rand scherp, golvend.

**Lamellen:** lichtoker, later helderroestgeel, L = 20 – 25, l = 3 – 5, fijn aangehecht, randen effen, oppervlak bruin gevlekt van de sporen.

**Steel:** 60 – 80 (-110) x 1 – 2 (-3) mm, cilindrisch, taps naar de top toe, basis iets knolachtig, snel hol, broos, witachtig tot lichtcrème, wit bepoederd, zwak vezelig in de lengte.

**Vlees:** witachtig, dun, geur zwak grassig tot aardeachtig, smaak eerst mild, bitter na ± 1 minuut kauwen.

**Ecologie:** in groepjes in (bemeste) weiden en in gazons. *Conocybe apala* is de enige witte *Conocybe*.

**Bron:** Fungi of Switzerland vol IV. (beschreven als *Conocybe lactea*).

