

Coprinopsis ochraceolanata

Geelvezelig hazenpootje



Ab Neutel waarneming.nl
Licentie CC BY



Ab Neutel waarneming.nl
Licentie CC BY

Coprinopsis ochraceolanata

Geelvezelig hazenpootje



Hoed: juist voor uitspreiding tot 30 x 20 mm, ovoïd, met afgeknotte top en een onregelmatige wat gelobde rand, nogal bleekgrijs aan de rand tot wat donkerder nabij de top, maar iets meer bruinig, diep en dicht gegroefd aan de rand, gegroefd gestreept nabij de top, met aangedrukt (maar bij jonge knoppen suberect), lange, dunne, vezelige, oker- tot zalmkleurige velumschubjes, gecondenseerd tot een dunne viltige zalm- tot okerkleurige plek in het centrum; de rand van de hoed in vroeg stadium contact verliezend met de steel; hoed tot 50 mm als uitgespreid.

Lamellen: L = 36 - 41, l = 1 - 3 (-5), dicht bijeen, vrij, nogal smal (tot 4 mm breed), reeds in jonge knoppen donkerchocoladebruin, tenslotte donkergrijsig purperbruin met dunne, bleekokerkleurige subvlokkige rand; pleurocystiden zichtbaar met handlens.

Steel: tot 80 x 5,5 mm, taps naar boven, hol, subgebundeld tot gebundeld, in sommige exemplaren met dunne, tot 12 mm lange pseudorhiza, iets grijsig wit, dicht vezelig, met okerkleurige tint door diep okerkleurig gele oppervlakkige vezels (onder lens), vooral nabij de basis soms met enkele incomplete bleekokerkleurige, vlokkige gordels of vele kleine, schubben met dezelfde kleur.

Vlees: chocoladebruin in het centrum van de hoed, iets meer grijsig purperbruin in de steelbasis, en bleker naar de steelholte; de rest bleek. Geur onbeduidend, zwak fungoïd. Smaak subraapachtig met wat bittere onaangename nasmaak.

Ecologie: gebundeld op oude modder in oude loofbossen op zandige klei met veel humus en bosafval; in groepjes op houtsnippers; nabij oude boomstronken.

Artikel: Sporen 2017 3 Gut Tilkin

Coprinopsis ochraceolanata

Geelvezelig hazenpootje



C. ochraceolanata is nauw verwant met *C. lagopus*, maar verschilt door slankere en dicht geïncrusteerde velumcellen (tot 20 µm breed), *C. lagopus* daarentegen heeft gladdere velumcellen die meer opgeblazen zijn (tot 40 µm breed). Macroscopisch is de velumkleur van *C. ochraceolanata* geeloker, bij *C. lagopus* wittig of grijsig, zelden bleekgeel maar dan zijn de hyfenwanden niet geïncrusteerd.

De sporenlengthe van *C. ochraceolanata* is zeer variabel. In Bas 5813 meten de sporen 8,3 – 11,8 x 5,8 – 6,8 µm, met een Q van 1,45 – 1,90. andere onderzochte collecties hebben sporen met een lengthe tot ca. 13 µm, de breedte van de sporen is constant in alle collecties. Het L/B-quotient is 1,50 – 2,10. Zulk een verschil in sporengrootte is niet ongewoon bij *Coprinus* en daarom accepteren we collecties met sporen tot 13 µm long als behorend tot *C. ochraceolanata*, omdat zij met de typecollectie de gelig korrelig geïncrusteerde 7-20 µm brede hyfen van het universeel velum gemeen hebben.

Coprinopsis ochraceolanata

Geelvezelig hazenpootje



[Coprinussite Kees Uljé](#)

 [Waarnemingen.be](#)

 [Waarneming.nl](#)

MYCOBANK Database

Champignons
de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres

NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

