

# *Leccinum cyaneobasileucum*

Bruingrijze berkenboleet



Ruud Wielinga waarneming.nl  
Licentie: CC BY-NC-ND



Freek van Loon waarneming.nl  
Licentie: CC BY

# *Leccinum cyaneobasileucum*

## Bruingrijze berkenboleet



Mat gekleurde grijsbruine hoed en wollig steeloppervlak

**Hoed:** tot 9 cm breed, jong half bolvormig, later gewelfd, rand niet of hooguit 0,5 mm over de buisjes hangend; fijn viltig, vochtig iets kleverig; egaal bleek- tot donkerbruin, wit tot ivoorkleurig bij bleke vorm, oud vanaf de rand een (olijf)groenige tint krijgend.

**Poriën en buisjes:** wit, dan roze grijs als grondkleur van de steel, tenslotte buisjes rozebruin, donkerder dan de poriën.

**Steel:** tot 25 mm dik, cilindrisch of verbredend naar de basis toe; grondkleur bleekgrijs of grijsbruin, vaak met roze tint, wit tot ivoorkleurig bij bleke vorm, aan de basis vaak met blauwige tot groenige tinten, oud met olijfkleurige tinten vanaf de steeltop; egaal met bleke bruinachtige of grijzige schubjes bezet, als kleine wratjes of vlokkige streepjes die maar weinig donkerder zijn dan de grondkleur, bij droog weer worden de topjes van de schubjes donker, tot donkerbruin; met ouderdom of opdrogen geen of onduidelijk net vormend.

**Bron:** Fungi of Switzerland volume 3.

De steel is bij jonge en volwassen exemplaren gelijkmatig over de hele lengte bedekt met schubjes die niet of slechts weinig contrasteren met de grondkleur. Dat is alleen nog bij [\*L. holopus\*](#) het geval. De schubjes kunnen na het verzamelen van de paddenstoelen in een droge omgeving donkerder worden. Dat is ook zo bij [\*L. holopus\*](#).

# *Leccinum cyaneobasileucum*

## Bruingrijze berkenboleet

