


Russula font-queri

Zalmsteelrussula



sporenfiguur 4a



Jacky Launoy waarnemingen.be



Jacky Launoy waarnemingen.be

Russula font-queri

Zalmsteelrussula



Jacky Launoy waarnemingen.be



Jacky Launoy waarnemingen.be

Russula font-queri

Zalmsteelrussula



Hoed: jong half bolvormig, later convex tot vlak en ietwat ingedeukt in centrum, effen tot licht aderig-tuberkelachtig, droog mat, nat glimmend en glibberig, jong donkerrozeviolet, later grijsroze met zwartpurperen centrum, soms met olijftint, rand nat fijn gestreept, 2 - 4 cm.

Lamellen: wit, later licht- tot donkergeel, smal aangehecht, randen gaaf en dikwijls plaatselijk rood, sporenfiguur IVa-b.

Steel: 3,5 – 6 x 0,8-2 cm, jong solide, oud hol, wit en dikwijls geheel of gedeeltelijk blozend roze.

Vlees: wit, geurloos, mild.

Chemie: FeSO₄ roze, guajak snel en sterk blauwgroen, phenol eerst vuilviolet, dan bruinachtig.

Ecologie: altijd bij Berk.

Solitair of in groepjes in moerassige bossen en aan de randen van moerassen, altijd bij Berk.

De zeer gelijkende *R. aurantiaca* groeit in gelijkaardige omstandigheden en kan niet gemakkelijk afgescheiden worden van *R. font-queri*. *R. aurantiaca* zou een sporenfiguur hebben van IVc, *R. font-queri* een sporenfiguur van IVa.

Bron: fungi of Switzerland volume 6.

Russula font-queri

Zalmsteelrussula



MYCOBANK Database

Pilzsuche

russulales news

NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen

Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Waarnemingen.be

Waarneming.nl

