

Sagaranella tylicolor

Kleine grauwkop



Sagaranella tylicolor

Kleine grauwkop



Hoed: 5 – 15 mm doormeter, jong hemisferisch-campanulaat, later conisch en dan vlak, altijd met een +- duidelijke bult, oppervlak jong zijdeachtig-vlokkig, dof, hygrofaan, donkergrijsbruin en bleker naar de rand bij vocht, en gestreept tot bijna het centrum, droog lichtbeige tot okerkleurig, rand scherp, ietwat voorbij de lamellen projecterend.

Lamellen: L = 22 – 25, l = 3, breed, lichtgrijs, fijn aangehecht tot bijna vrij, randen met dezelfde kleur als de hoed, effen tot fijn gezaagd.

Steel: 30 – 50 x 1 – 2 mm, cilindrisch, wat getorst, oppervlak effen, satijnachtig, in de lengte vezelig gegroefd, zilverwit, soms met een zwak bruine tint, vooral naar de basis, top wat wit vlokkig, hol, broos.

Vlees: bij vocht grijsbruin en waterig, dun; geur iets raphanoïd, smaak mild, iets melig.

Alleen of in groepjes in berkenbossen of gemengde loof- naaldbossen op naalden en bladeren op de grond. Zeldzaam.

Bron: Fungi of Switzerland vol 3

De ruigsporige soorten van van het *Tesquorum*complex worden onderscheiden op basis van hun ecologie. *L. erosa* en *L. tusquorum* zijn grasminnend en lichtminnend. *L. tylicolor* wordt beschouwd als groeiend in bossen.

Sagaranella tylicolor

Kleine grauwkop



NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen

